biolab		CÓD. MATERIAL		DESCRIÇÃO DO MATERIAL			ARQUIVO
		ME266825		BU EXT CANNABIS			00
DATA DE CONFECÇÃO		CONFECCIONADO POR		SENTIDO DE BOBINAMENTO	FACE / POSIÇÃO DE IM-		
09/05/2022		ESTEVÃO					
DIMENSIONAL				RES (1X1)			
320 X 160 mm	() MEDISEAL () NOACK () IMA () BLIPACK (X) N/A		PROCESS BLACK U		NA	NA	

Extrato de Cannabis sativa Promediol

200 mg/mL



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DE CANNABIS

Extrato de *Cannabis sativa* Promediol 200 mg/mL. Derivado vegetal *Cannabis sativa* L.

APRESENTAÇÕES

Solução gotas de extrato de *Cannabis sativa* L. a 20% (200 mg/mL) em embalagem com 1 frasco gotejador contendo 10 mL.

USO ORAL

COMPOSIÇÃO

Contém 20% (200 mg/mL) extrato de *Cannabis sativa* L. que corresponde a 50 mg/mL de canabidol (CBD) e não mais que 0,2% (2mg/mL) de THC em triglicerídeos de cadeia média (TCM). Veículo (triglicerídeos de cadeia média)



INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE PRODUTO?

Pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes da fórmula não devem fazer uso de extrato de *Cannabis sativa* Promediol.

Este produto não deve ser utilizado por pacientes usuários de drogas de abuso. Este produto não deve ser utilizado em crianças menores de 2 (dois) anos de idade.

2. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE PRODUTO?

Advertências quanto ao uso do produto Este produto não substitui o uso de medicamentos registrados.

Este produto não possui os estudos clínicos completos que comprovam a sua eficácia e segurança.

Há incertezas quanto à segurança à longo prazo do uso dos produtos de *Cannabis* como terapia médica.

O uso do produto de *Cannabis* é admitido quando há uma condição clínica definida em que outras opções de tratamentos estiverem esgotadas e que dados científicos sugerem que a *Cannabis* pode ser eficaz. O uso desse produto pode causar dependência física ou psíquica.

Durante o uso do produto, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas ou realizar atividades que impliquem em riscos para si e para terceiros, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas.

Atenção: risco para mulheres grávidas e lactantes.

Este produto deve ser administrado com cautela em pacientes com contraceptivos orais, pois pode ocasionar redução da eficácia de contraceptivos orais.

Este produto é de uso individual, é proibido passar para outra pessoa.

Se você for viajar para outro país, pode ser ilegal levar este produto. Verifique a situação legal deste produto antes de viajar com o extrato de *Cannabis sativa* Promediol.

O extrato de *Cannabis sativa* Promediol é composto por um extrato padronizado de partes aéreas de *Cannabis sativa L*. contendo o equivalente a 200 mg/mL de extrato de *Cannabis* medido como a soma de CBD e CBDA; contém também outros componentes naturais do extrato e a concentração de THC é inferior a 0,2%.

Idosos

Recomenda-se o aumento de dose mais lento e uma dose máxima menor do que a dose usualmente empregada para pacientes mais jovens.

Pacientes com distúrbios hepáticos, renais, intestinais, cardiovasculares e neurológicos

Extrato de *Cannabis sativa* Promediol deve ser administrado com cautela em pacientes com comprometimento da função hepática, distúrbio cerebral, tumor cerebral, doença metabólica ou neurodegenerativa com progressão rápida, hipotensão ou hipertensão e anormalidades significativas em eletrocardiograma. Também deve ser administrado com cautela em pacientes com disfagia grave. O uso do produto em pacientes com disfagia grave sem uso de sonda gástrica ou não-gástrica pode implicar em risco de aspiração do produto pelo paciente e, consequentemente, complicações pulmonares.

Reações provenientes da retirada

O extrato deve ser retirado gradualmente, porém se a retirada for necessária devido a um evento adverso a descontinuação rápida pode ser considerada.

Interação medicamentosa

O extrato pode apresentar interações com fármacos metabolizados pelo figado, especificamente pela via do citocromo P450, tais como clobazam, topiramato, rufinamida, desmetilclobazam, zonisamida, eslicarbazepina, valproato, indutores de CYP3A4 e CYP2C19 (como carbamazepina, fenitoína, rifampicina). Portanto é recomendado o monitoramento plasmático periódico dos fármacos antiepilépticos administrados concomitantemente com este produto, de modo a avaliar se estão dentro dos níveis terapêuticos. O uso concomitante de produtos de Cannabis com outros depressores do SNC ou com bebidas alcoólicas pode aumentar o risco de sedação e sonolência. O extrato pode reduzir a eficácia de contraceptivos orais

O uso concomitante do produto de *Cannabis* com medicamentos anticonvulsivantes deve ser acompanhado conforme supervisão médica (monitoramento por Eletroencefalografia—EEG), com ajuste de dose, se necessário, uma vez que poderá ocorrer interações na medicação básica do paciente.

Interação com exames laboratoriais

Até o momento, não há dados na literatura sobre a ocorrência de interferência do uso de produtos de *Cannabis* em exames laboratoriais.

Interação com alimentos

O extrato de *Cannabis sativa* Promediol dever ser administrado com alimentos para melhor absorção do produto.

3. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE PRODUTO?

Este produto deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). Proteger da luz e umidade. Nestas condições o prazo de validade é 24 meses a contar da data de fabricação. Após aberto o produto pode ser conservado por 2 meses nas condições mencionadas.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use este produto com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.





Extrato de Cannabis sativa Promediol apresenta-se na forma de um líquido oleoso, brilhante, de coloração verde escura e sabor levemente de planta.

Antes de usar, observe o aspecto deste produto. Este produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Descarte do produto de Cannabis não utilizado e/ou com data de validade vencida.

O descarte do produto de Cannabis no meio ambiente deve ser minimizado. O produto de Cannabis não deve ser descartado no esgoto, vaso sanitário ou descarte em lixo doméstico. Procure o ponto de descarte mais próximo.

4. COMO DEVO USAR ESTE PRODUTO?

Extrato de Cannabis sativa Promediol deve ser administrado por via oral com o auxílio do gotejador, junto com alimentos para melhor absorção do produto.

Para administrar este produto, gire a tampa no sentido anti-horário para romper o lacre.

- 1. Retire a tampa interna do frasco de extrato de Cannabis sativa Promediol.
- 2. Para começar o gotejamento, vire o frasco e mantenha-o na posição vertical, bata levemente com o dedo no fundo do frasco e deixe gotejar a quantidade desejada.
- 3. Tampe o frasco sem retirar o gotejador e guarde-o no cartucho.

Posologia

A posologia de extrato de *Cannabis sativa* Promediol pode variar de acordo com características e gravidade da patologia, idade, peso corporal, uso de medicamentos pelo paciente e resposta clínica. A literatura cita a administração de extrato de Cannabis em doses entre 2,5 e 25 mg/Kg/dia, sendo a dose aumentada gradualmente.

No entanto, o médico deve definir a dose de tratamento com base na resposta clínica favorável e tolerabilidade ao produto de Cannabis, sendo necessário monitoramento periódico das funções hepáticas. Caso seja necessária a interrupção da utilização do produto, recomenda-se que a dose seja reduzida gradualmente e nunca abruptamente.

Não exceda o uso indicado pelo prescritor. Este produto deve ser usado somente conforme orientação médica.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração da utilização do extrato de Cannabis sativa Promediol. Não interrompa o uso do extrato de Cannabis sativa Promediol sem o conhecimento do seu médico.

5. O QUE DEVO FAZER QUANDO ESQUE-CER DE USAR ESTE PRODUTO?

Caso haja esquecimento da administração de uma dose, consulte o seu médico sobre como proceder. Em caso de dúvidas, procure orientação de profissional de saúde.

6. QUAIS OS MALES QUE ESTE PRODUTO PODE ME CAUSAR?

Os eventos adversos descritos na literatura científica em estudos com produtos de Cannabis são: infecções em geral, sonolência, sedação, insônia, aumento ou redução do apetite, perda 🕺 de peso, distúrbios gastrointestinais, distúrbios respiratórios, irritabilidade, agitação, agressividade, fadiga, astenia, mal-estar, reações de hipersensibilidade na pele e alteração nos níveis de enzimas do figado.

Em casos de eventos adversos, notifique pelo

Sistema VigiMed, disponível no Portal da ANVISA.

7.0 QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDI-**CADA DESTE PRODUTO?**

O produto deve ser administrado exclusivamente por via oral, podendo haver sérios riscos ao paciente o uso por outra via.

De acordo com os dados de literatura disponíveis, é recomendado que a dose máxima de 25 mg/Kg/ dia não seja excedida e que todos os pacientes que estejam utilizando este produto fiquem sob cuidadosa supervisão médica.

Os efeitos relacionados à superdosagem podem estar relacionados a alterações hepáticas significativas, sonolência, agitação, diminuição do nível de consciência, depressão da respiração e coma. O tratamento da superdose é sintomático, sendo que a dose deve ser diminuída ou a administração interrompida.

Em caso de uso de grande quantidade deste produto, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou folheto informativo, se possível.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓPODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DE RECEITA.

Autorização Sanitária nº 1.4313.0001

Farmacêutico Responsável: Dra. Eline Ap. Amaral Sêga CRF-SP 23.269

Fabricado por

Soho Flordis International Switzerland S.A. Bioggio, Suiça.

Autorizado para Promediol do Brasil Ltda. Rua Clóvis Soares 200 Atibaia SP 12942-560 CNPJ 36.984.046/0001-30 Empresa Brasileira

Importado e Distribuído por Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. Pouso Alegre MG

SAC 0800 724 6522

biolab

