

**Mylanta<sup>®</sup>  
Plus**  
**hidróxido de alumínio,  
hidróxido de magnésio e simeticona**

**Sabores Menta ou Morango**  
Suspensão oral em frasco com 240 mL

**USO ADULTO**  
**USO ORAL**

**ANTIÁCIDO**  
**ALÍVIO RÁPIDO PARA AZIA, MÁ DIGESTÃO, ACIDEZ ESTOMACAL E GASES**

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE:**

**COMPOSIÇÃO:** 400 mg de hidróxido de alumínio, 400 mg de hidróxido de magnésio e 30 mg de simeticona a cada 5 mL.  
Excipientes (sabor menta): propilparabeno, sorbitol solução, ácido cítrico, aroma natural de hortelã, essência de limão, metilparabeno, sacarina sódica diidratada e água purificada.  
Excipientes (sabor morango): propilparabeno, sorbitol solução, ácido cítrico, aroma artificial de morango, corante vermelho, metilparabeno, sacarina sódica diidratada e água purificada.

**INDICAÇÕES:** alívio sintomático da acidez estomacal, azia e má digestão associadas ao diagnóstico de úlcera péptica, gastrite, esofagite péptica e hérnia de hiato e também alívio dos sintomas consequentes a gases.

**CONTRAINDICAÇÕES:** MYLANTA<sup>®</sup> PLUS é contraindicado a pacientes que apresentam hipersensibilidade (alergia) a qualquer componente de sua fórmula.

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:** informe a um médico a ocorrência de gravidez durante e após o término do tratamento, ou ainda se estiver amamentando. Pacientes com disfunção renal não devem utilizar o produto.

**Atenção:** este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser utilizado com cautela em diabéticos.

**Informe a um médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**REAÇÕES ADVERSAS:** alterações discretas de trânsito intestinal, hipermagnesemia, intoxicação por alumínio, encefalopatia, osteomalácia e hipofosfatemia.

**Informe a um médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.**

**MODO DE USAR:** 2 a 4 colheres de chá, de preferência entre as refeições e ao deitar ou de acordo com o critério médico. Não exceder 12 colheres-medida em 1 dia e não utilizar a dose máxima por mais de 2 semanas.

**USO ORAL. AGITE BEM ANTES DE USAR.**

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

**CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:** Conservar o medicamento em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

O prazo de validade está indicado na embalagem externa.  
**Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

MS – 1.5721.0007  
Farmacêutica Responsável: Fernanda P. Runha – CRF-SP nº 29.761

**Fabricado e Embalado por:**  
Nycomed Pharma Ltda.  
Jaguariúna – SP  
CNPJ nº 60.397.775/0008-40  
Indústria Brasileira

**Registrado por:**  
**Johnson & Johnson INDUSTRIAL Ltda.**  
Rod. Presidente Dutra, km 154 - São José dos Campos - SP  
CNPJ: 59.748.988/0001-14

Serviços ao Consumidor  
0800 728 6767  
www.jnjbrasil.com.br

172789

Laetus: 287