

POSOLOGIA

Infestações por helmintos:

Adultos e crianças (maiores de 2 anos)

Dose usual: 1 comprimido de albendazol 400 mg, em dose única ou 10 ml da suspensão oral em dose única.

Nos casos de infestações confirmadas ou suspeita por *Strongyloides stercoralis* e *Taenia spp*, albendazol 400 mg, como dose única, deve ser administrado por três dias consecutivos.

Se o paciente não se curar após três semanas, deve-se iniciar um segundo curso de tratamento.

Giardíase:

Uma dose única de albendazol 400 mg comprimidos ou 10 ml de albendazol suspensão oral, diariamente, por 5 dias é eficaz em crianças.

Os comprimidos podem ser engolidos, mastigados, triturados ou misturados a alimentos. Não é necessário utilizar procedimentos especiais, como purgantes ou dieta.

ADVERTÊNCIAS

Antes de utilizar o medicamento deve-se assegurar de que não há processo de gravidez em mulheres em idade fértil (15 - 40 anos). O albendazol deve ser administrado depois de 7 dias após o início da menstruação.

O uso de albendazol em crianças menores de 2 anos ainda não está bem estudado.

USO EM IDOSOS, CRIANÇAS E OUTROS GRUPOS DE RISCO

Não existem observações diferentes das que já foram citadas sobre o uso em idosos e crianças.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Ainda não se tem relatos sobre a possibilidade de ocorrerem interações entre o albendazol e outros fármacos.

REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

O albendazol é geralmente bem tolerado. Raramente pode ocorrer dor abdominal, diarreia, náuseas, vômitos, tontura, cefaléia, secura da boca e prurido cutâneo.

SUPERDOSE

No caso de superdosagem com este medicamento recomenda-se fazer lavagem gástrica.

ARMAZENAGEM

Este medicamento deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), em lugar seco, fresco e ao abrigo da luz. Nestas condições o prazo de validade é de 24 meses a contar da data de fabricação.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Reg. MS 1.2568.0029 (suspensão oral)
Reg. MS 1.2568.0052 (comprimido mastigável)
Farmacêutico Responsável: Dr. Luiz Donaduzzi CRF-PR 5842 R2
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Rua Mitsugoro Tanaka, 145
Centro Industrial Nilton Arruda Toledo - PR
CNPJ 73.856.593/0001-66
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Centro de Atendimento ao Consumidor
0800 709 9333 / (45) 2103-1166
www.pratidonaduzzi.com.br
cac@pratidonaduzzi.com.br



prati, donaduzzi

albendazol

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O MEDICAMENTO

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

Comprimido mastigável de 400 mg: embalagem com 1, 80 e 100 comprimidos mastigáveis.

Suspensão oral de 40 mg/ml: frasco com 10 ml.

USO ORAL USO ADULTO E PEDIÁTRICO

FÓRMULA

Cada comprimido mastigável contém:

albendazol.....400mg
excipiente q.s.p.....1 comprimido mastigável
Excipientes: polivinilpirrolidona, amido de milho, celulose microcristalina, lauril sulfato de sódio, dióxido de silício coloidal, croscarmellose, talco, essências de baunilha e laranja, glicerina, sacarina sódica, estearato de magnésio, glicolato de amido sódico, polímero do ácido metacrílico e polietilenoglicol.

Cada 10 ml da suspensão oral contém:

albendazol.....400mg
excipiente q.s.p.....10ml
Excipientes: glicerina bidestilada, silicato de alumínio e magnésio, carboximetilcelulose sódica, monolaurato de sorbitano, polissorbato 80, sorbato de potássio, ácido sórbico, ácido benzóico, dimeticona, sacarina sódica dihidratada, aroma natural de banana, aroma natural de manga e água deionizada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O albendazol apresenta atividade anti-helmíntica, inicialmente imobiliza os helmintos e posteriormente os mata, eliminando totalmente os parasitas quando administrado em doses adequadas à espécie e número de vermes presentes no hospedeiro. O início da ação ocorre logo após a ingestão da dose.

PORQUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

O albendazol é indicado no tratamento de infecções simples ou mistas causadas por parasitas do intestino e giárdia.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contra-indicado a pessoas com hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula. O albendazol não deve ser utilizado durante a gravidez ou em mulheres com possibilidade de engravidar. Antes de utilizar o medicamento deve-se assegurar de que não há processo de gravidez em mulheres em idade

fértil (15 - 40 anos). O albendazol deve ser administrado depois de 7 dias após o início da menstruação. O uso de albendazol em crianças menores de 2 anos ainda não está bem estudado.

Ainda não se tem relatos sobre a possibilidade de ocorrerem interações entre o albendazol e outros fármacos.

"Este medicamento é contra-indicado na faixa etária abaixo de 2 anos".

"Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis".

"Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento".

"Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde".

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Albendazol 400 mg: comprimido mastigável, oblongo, sabor laranja e baunilha, cor branca a parda.

Albendazol 40mg/ml: suspensão oral, cor creme, sabor banana e manga.

Infestações por helmintos:

Adultos e crianças (maiores de 2 anos)

Dose usual: 1 comprimido de albendazol 400 mg, em dose única ou 10 ml da suspensão oral em dose única.

Nos casos de infestações confirmadas ou suspeita por *Strongyloides stercoralis* e *Taenia spp.*, albendazol 400 mg, como dose única, deve ser administrado por três dias consecutivos.

Se o paciente não se curar após três semanas, deve-se iniciar um segundo curso de tratamento.

Giardiase:

Uma dose única de albendazol 400 mg comprimidos ou 10 ml de albendazol suspensão oral, diariamente, por 5 dias é eficaz em crianças.

Os comprimidos podem ser engolidos, mastigados, triturados ou misturados a alimentos. Não é necessário utilizar procedimentos especiais, como purgantes ou dieta.

"Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento".

"Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico".

"Não use medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento".

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Foram relatados raros casos de desconforto gastrointestinal, náusea, vômito, diarreia, constipação, cefaléia, secura da boca e prurido cutâneo, porém não foi demonstrada qualquer relação definitiva com o albendazol.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTES MEDICAMENTOS DE UMA SÓ VEZ?

Se ocorrer ingestão de grande quantidade deste medicamento deve-se buscar orientação médica.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), em lugar seco, fresco e ao abrigo da luz (evite armazená-lo no banheiro). Nestas condições o prazo de validade é de 24 meses a contar da data de fabricação.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

O albendazol apresenta ação ovicida, larvicida e helminticida no homem.

Atua por inibição da polimerização dos túbulos e assim, o nível de energia do parasita torna-se inadequado à sua sobrevivência. Albendazol primeiramente imobiliza os helmintos e depois os mata.

Após dose oral administrada ao homem, o albendazol é pouco absorvido (menos de 5%) e a maior parte de sua ação anti-helmíntica ocorre na luz intestinal. Com uma dose de albendazol de 6,6 mg/kg de peso, a concentração plasmática de seu principal metabólito, um sulfóxido, atinge o máximo de 0,25 a 0,30 µg/ml após aproximadamente 2 1/2 horas. A vida média de eliminação do sulfóxido plasmático é de 8 1/2 horas. O metabólito é eliminado através da urina.

INDICAÇÕES

O albendazol é um agente anti-helmíntico versátil, sobretudo contra os nematóides gastrointestinais, onde sua ação não é ditada por sua concentração sistêmica. É bastante eficaz na ascariíase intestinal, enterobiase, triquinose, tricuriase e ancilostomíase (*Ancylostoma duodenale* e *Necator americanus*) seja como infestações únicas ou mistas. É ativo tanto contra o estágio larvar quanto adulto dos nematódeos e ovicida para *Ascaris* e *Trichuris*. Em crianças é bastante eficaz ao combate da *Giardia duodenalis*.

CONTRA-INDICAÇÕES

É contra-indicado durante a gravidez, mulheres com possibilidade de engravidar, lactação, em pacientes com hipersensibilidade ao albendazol ou qualquer outro componente da fórmula.

Não é recomendado o uso em crianças com menos de 2 anos de idade.

MODO DE USAR E CONSERVAÇÃO DEPOIS DE ABERTO

Os comprimidos podem ser engolidos, mastigados, triturados ou misturados a alimentos. Não há necessidade de procedimentos especiais, tais como dieta ou purgantes.

Este medicamento deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), em lugar seco, fresco e ao abrigo da luz (evite armazená-lo no banheiro).