



GERILON
ginseng + vitaminas e minerais associados

I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: GERILON
Nome genérico: ginseng + vitaminas e minerais associados

APRESENTAÇÕES

Cápsula gelatinosa mole – Embalagem contendo 30 ou 60 cápsulas gelatinosas mole

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula gelatinosa mole de **GERILON** contém:

		%IDR*
<i>Panax ginseng</i> C. A. Mey (7-8% de ginsenosídeos).....	100 mg	
acetato de retinol (vitamina A)	2.000 UI.....	200,00
nitrato de tiamina (vitamina B1).....	1,3 mg	216,67
riboflavina (vitamina B2).....	1,3 mg	200,00
cloridrato de piroxina (vitamina B6).....	0,5 mg.....	76,92
cianocobalamina (vitamina B12).....	4 mcg.....	333,33
ácido ascórbico (vitamina C).....	65 mg.....	288,89
colecalfiferol (vitamina D3).....	400 UI	400,00
acetato de alfatocoferol (vitamina E)	10 UI	134,23
biotina	10 mcg.....	66,67
pantotenato de cálcio.....	5 mg	200,00
flúor (na forma de fluoreto de sódio)	45 mcg	2,25
cálcio (na forma de fosfato de cálcio dibásico).....	30,05 mg	6,00
ferro (na forma de fumarato ferroso)	3,67 mg.....	52,43
iodo (na forma de iodeto de potássio)	0,115 mg.....	176,92
magnésio (na forma de sulfato)	1,05 mg.....	0,81
manganês (na forma de sulfato)	0,487 mg	42,35
fósforo (na forma de fosfato de cálcio dibásico)	23 mg.....	6,57
nicotinamida.....	13 mg	162,5
potássio (na forma de sulfato).....	2,24 mg	
rutosídeo.....	10 mg	
Excipientes q.s.p.....	1 cápsula	
(óleo de soja, lecitina de soja, dióxido de silício, óleo de soja hidrogenado, cera de abelha branca, gelatina, glicerol, corante vermelho ponceau 4R, corante amarelo crepúsculo, corante azul brilhante, metilparabeno, propilparabeno, sorbitol, água purificada e dióxido de titânio)		

* %IDR- Ingestão Diária Recomendada – Considerando as duas cápsulas que deverão ser ingeridas por dia.

II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é destinado como suplemento vitamínico e também no tratamento dos sintomas associados à fadiga física e/ou mental.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

GERILON, por sua composição atua como suplemento vitamínico e também no tratamento dos sintomas associados à fadiga física e/ou mental.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O uso de **GERILON** é contraindicado nos seguintes casos: em pacientes com antecedentes de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula; em pacientes que fazem uso de levodopa ou

salicilatos, e/ou uso rotineiro de medicações que alterem as funções cognitivas, como barbitúricos, anticonvulsivantes, benzodiazepínicos, neurolépticos, álcool e drogas ilícitas; no tratamento de hipovitaminoses específicas graves, além disso, o uso de preparados contendo nicotinamida é contraindicado a pacientes portadores de úlcera gastroduodenal evolutiva e naqueles sob dieta com restrição de sal.

Não há contraindicações relativas a faixas etárias.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe também se está amamentando.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

O uso do medicamento em pacientes renais crônicos deve ser avaliado.

A vitamina B6 diminui a ação da levodopa por estimulação da dopa-carboxilase periférica.

Os salicilatos aumentam a excreção urinária do ácido ascórbico.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

GERILON deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz e da umidade.

GERILON possui prazo de validade de 24 meses a partir da data da sua fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

GERILON se apresenta na forma de cápsula de gelatina mole, oval, cor vinho, contendo suspensão oleosa de cor amarelada.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Ingerir 1 cápsula no café da manhã e 1 cápsula no almoço, com auxílio de um pouco de líquido.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Podem ocorrer reações indesejáveis tais como: irritação da pele, coceira e vermelhidão.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

8. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não há relatos de superdosagem com o medicamento.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

III - DIZERES LEGAIS

MS 1.1560.0084

Farm. Resp.: Dra. Michele Caldeira Landim - CRF/GO: 5122

Fabricado por:

Relthy Laboratórios Ltda.

Av. José Vieira, 446





CEP: 13347-360
Distrito Industrial Domingos Giomi
Indaiatuba / SP
CNPJ: 58.884.735/0001-05 – Indústria Brasileira

Registrado por:

CIFARMA – Científica Farmacêutica Ltda.
Rod. BR 153 Km 5,5 – Jardim Guanabara
CEP: 74675-090 – Goiânia – GO
CNPJ: 17.562.075/0001-69 – Indústria Brasileira

CAC: 0800-7071212

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA