

■
■
auxílio médico imediatamente.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR.
NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PRO-
CURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

Nº do lote, data de fabricação e prazo de validade:
vide embalagem.

Medicamento de Notificação Simplificada
RDC nº 199/2006 - AFE Nº 1.04381-0

Farm. Resp.: Charles Ricardo Mafra
CRF-MG 10.883

Notificado por: Cimed Ind. de Medicamentos Ltda.
Rua Engenheiro Prudente, 121 - CEP: 01550-000
São Paulo/SP - CNPJ: 02.814.497/0001-07

Fabricado por: Cimed Ind. de Medicamentos Ltda.
Av. Cel. Armando Rubens Storino, 2750
Pouso Alegre/MG - CEP 37550-000
CNPJ 02.814.497/0002-98
Indústria Brasileira – ® Marca Registrada



1301568BU0112 - 183 x 130 - PH 520

BABYMED® menina



palmitato de retinol +
colecalciferol +
óxido de zinco



USO PEDIÁTRICO - USO EXTERNO/ TÓPICO

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

Pomada - Embalagem com 1 bisnaga de 45 g

COMPOSIÇÃO:

Cada 1 g da pomada contém:

palmitato de retinol (vitamina A) ... 1.000 UI

colecalciferol (vitamina D) 400 UI

óxido de zinco..... 100 mg

Excipientes* q.s.p..... 1 g

*vaselina, óleo mineral, talco, lanolina anidra,
monoestearato de glicerila e aroma de morango.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

Babymed® menina é uma pomada para assadura indicada como secativa, cicatrizante, utilizada na prevenção de assaduras e brotoejas.

PRAZO DE VALIDADE:

O prazo de validade encontra-se impresso nas embalagens. **Não usar o produto se o prazo de validade estiver vencido.**

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

MODO DE USAR:

Uso externo. Aplicar nas áreas afetadas após

limpeza, quando necessário.

SIGA AS ORIENTAÇÕES DO SEU MÉDICO, RESPEITANDO SEMPRE OS HORÁRIOS, AS DOSES E A DURAÇÃO DO TRATAMENTO.

A utilização do produto pode ser interrompida a qualquer momento sem provocar danos ao paciente.

Em casos de irritação cutânea, suspender a utilização da pomada e procurar orientação médica. Informe seu médico sobre o aparecimento de qualquer reação desagradável durante a utilização.

Atenção: Devido a presença de aroma de morango na formulação, este produto foi destinado ao público infantil feminino, o que não restringe o uso no público infantil masculino.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Não utilizar a pomada perto dos olhos de modo a evitar contato com a conjuntiva.

Não utilizar a pomada em ferimentos profundos e queimaduras graves.

NÃO UTILIZE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

O óxido de zinco possui propriedades adstringentes e antissépticas, atuando como cicatrizante e protetor da pele nas afecções que apresentam erupções superficiais. Forma uma capa protetora sobre a superfície cutânea lesionada, impedindo a irritação pelo ar e a fricção das roupas sobre a

pele, diminuindo assim o ardor e prurido. O óxido de zinco, dado ao seu efeito absorvente apresenta também uma ação secativa e esta dessecação torna o meio desfavorável para o crescimento bacteriano. As vitaminas A e D desempenham um papel fundamental na regeneração do epitélio, bem como da regulação do crescimento e diferenciação dos tecidos epiteliais.

INDICAÇÕES:

Como pomada secativa, cicatrizante, utilizada na prevenção de assaduras e brotoejas.

CONTRAINDICAÇÕES:

O uso do produto é contraindicado para pessoas com antecedentes de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

PRECAUÇÕES:

Não aplicar o produto em casos de queimaduras graves.

REAÇÕES ADVERSAS:

Raramente foram relatados casos de irritação cutânea.

POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO:

Retire o excesso de fezes com a parte limpa da fralda. Com o auxílio de um algodão umedecido em água, faça a higiene da região íntima do bebê. Retire o excesso de umidade com uma toalha e aplique Babymed® em todas as trocas de fraldas para manter o bebê sempre protegido de assaduras.

SUPERDOSAGEM:

Em caso de superdosagem acidental, procure