

Forma farmacêutica e apresentação

Comprimidos - Frasco com 60 comprimidos de 0,150 g - USO ORAL

Via de administração: via oral

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Composição - Cada comprimido contém:

Cantharis 3CH 0,0075 ml, Thuya occidentalis 3CH 0,0075 ml.

Excipiente qsp 0,150 g. Excipiente: Lactose

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Para que este medicamento serve?

Este medicamento é utilizado como auxiliar no tratamento da cistite.

A indicação deste medicamento só poderá ser alterada a critério do prescritor.

Como este medicamento funciona?

Este é um medicamento homeopático composto, preparado segundo os fundamentos da homeopatia e de acordo com as técnicas descritas na Farmacopéia Homeopática Brasileira. Age através do princípio da Lei dos Semelhantes. Os componentes da fórmula deste medicamento foram devidamente experimentados em humanos. Essas pessoas relataram os sinais e sintomas que apresentaram durante a experimentação. Pacientes que venham relatar ao clínico sintomas semelhantes aos experimentados podem usar este medicamento.

Como devo usar este medicamento?

A dose sugerida para adultos é de 2 comprimidos a cada 2 horas por via oral. As crianças menores de 12 anos devem tomar 1 comprimido a cada 2 horas por via oral. Os comprimidos poderão ser dissolvidos na boca ou com água. Se você esquecer de tomar uma dose, você não deve duplicar a dose na próxima.

Antes de usar observe o aspecto do medicamento. Os comprimidos são brancos e com um símbolo AP gravado em um dos lados.

Não é necessário acordar à noite para tomar o medicamento homeopático.

Mantenha sempre a dose ou o modo de tomar sugerido nesta bula.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação do prescritor.

Quando não devo usar este medicamento?

Ainda não são totalmente conhecidas as contra-indicações e limitações de uso dos medicamentos homeopáticos.

Se o paciente for hipersensível aos componentes da fórmula, o seu médico deve ser informado, bem como no aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

Este medicamento contém LACTOSE.

Como devo proceder no caso de gravidez ou no período de lactação?

Informe seu médico sua gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se estiver amamentando.

O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?

O que fazer em caso de ingestão acidental ou intencional do medicamento?

A melhor conduta numa destas situações é a de espera e observação. Aumente a ingestão de líquidos. Caso ocorram vômitos ou enjôos, procure ajuda emergencial médica.

Em caso de ingestão acidental e/ou ingestão acima da dose sugerida ou, ainda, em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico.

Onde e como devo guardar este medicamento?

O prazo de validade deste medicamento é de 24 meses a partir da data de fabricação (vide embalagem), desde que observadas as condições necessárias de armazenamento.

Não tome medicamento com prazo de validade vencido, pois, além de não obter o efeito desejado, você estará prejudicando sua saúde.

PARA SUA SEGURANÇA, MANTENHA O MEDICAMENTO NA EMBALAGEM ORIGINAL ATÉ SEU USO TOTAL.

ConsERVE o medicamento em local fresco, seco e ao abrigo da luz. Manter em temperatura ambiente (15°C a 30°C). Feche a embalagem adequadamente logo após o uso. Proteger da luz solar e de fontes de irradiação eletromagnética, como por exemplo: forno de microondas, aparelho celular, televisão, etc.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Informações gerais

O que devo saber sobre o medicamento homeopático ?

O medicamento homeopático pode ser indicado de acordo com as Escolas Médicas Homeopáticas existentes: Unicista ou Complexista. Na Unicista, o tratamento é feito com um único medicamento e "o medicamento homeopático é indicado segundo a individualidade de cada paciente e não para doenças específicas". Neste caso, "a dose do medicamento é individualizada para cada paciente".

Na Complexista, o clínico prescreve dois ou mais insumos ativos homeopáticos num único frasco, que é chamado de Complexo Homeopático. São indicados para o tratamento de enfermidades específicas com comprovada ação terapêutica descrita nas Matérias Médicas Homeopáticas e com a similitude (semelhança) dos sintomas dessas doenças.

Use o medicamento dentro do prazo de validade.

Contribua com o tratamento: relate ao prescritor todos os tratamentos que você já fez ou está fazendo. Atenda às sugestões do prescritor, para que seu tratamento seja eficaz.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

Não observando o resultado esperado, consulte o prescritor ou farmacêutico.

Não se automedique, pode ser prejudicial à saúde e dificultar o diagnóstico correto do médico.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Características farmacológicas com base nos fundamentos da Homeopatia:

É um medicamento homeopático composto, obtido pelo método hahnemanniano, cujos componentes da fórmula têm suas principais ações descritas nas Matérias Médicas Homeopáticas:

Cantharis: Dor ardente e dificuldade de urinar. Intolerável necessidade freqüente de urinar. Cistite com dores violentas com queimação, antes, durante e após a micção. A urina é escura e às vezes sanguinolenta.

Thuya occidentalis: Tem uma forte eficácia como reparador de tecidos. Age diretamente sobre o epitélio renal e tem ação tônica sobre a musculatura da bexiga. Muito útil nas cistites.

Indicação: Como auxiliar no tratamento da cistite.

Contra-indicações: Não são totalmente conhecidas as contra-indicações e limitações de uso dos medicamentos homeopáticos. Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Posologia sugerida: O medicamento deverá ser administrado enquanto durarem os sintomas.

Adultos: 2 comprimidos a cada 2 horas por via oral. Crianças: 1 comprimido a cada 2 horas por via oral.

Em caso de esquecimento de administração, o paciente não deverá duplicar a quantidade de medicamento na próxima tomada. Não é necessário acordar à noite para tomar o medicamento homeopático.

A conduta em caso de superdosagem ou ingestão acidental e/ou intencional de medicamentos homeopáticos é a de espera e observação. Aumentar a ingestão de líquidos. Caso ocorram vômitos ou enjôos, por causa de superdosagem, proceder a lavagem gástrica e/ou intestinal.

Advertências: Pacientes que tenham apresentado hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias pode envolver risco e devem estar sob a responsabilidade do prescritor.

Este medicamento contém LACTOSE. Não requer recomendações especiais em pacientes idosos.

Informe seu médico sua gravidez durante o tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se estiver amamentando. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do seu médico ou cirurgião-dentista. O medicamento homeopático deverá ser conservado na embalagem original em local fresco, seco e ao abrigo da luz. Deverá ser mantido em temperatura ambiente (15°C a 30°C). Evitar o contato com equipamentos que emitam radiações.

ESTE É UM MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Registro MS 1.0266.0008.001-7

Farmacêutica Responsável: Dra. Zuleika Carvalho - CRF/SP 4.142

Nº do lote, data da fabricação e data da validade: vide embalagem.



Farmácia e Laboratório Homeopático

ALMEIDA PRADO Ltda.

Praça Benedito Calixto 129/133 - São Paulo-SP
CNPJ 60.862.208/0001-41 - Indústria Brasileira
Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-116311