

Secnidazol

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999

Reg. MS - 1.0047.0559

Apresentações: secnidazol 1000 mg. Embalagem contendo 2 ou 4 comprimidos. **Indicações:** Giardíase; amebíase intestinal sob todas as formas; amebíase hepática; tricomoníase. **Contraindicações:** Hipersensibilidade aos derivados imidazólicos ou a qualquer componente do produto; suspeita de gravidez e nos três primeiros meses desta; aleitamento. **Precauções e Advertências:** Deve-se evitar a ingestão de bebidas alcoólicas durante o tratamento e por até 4 dias após o seu término. Recomenda-se evitar a administração aos pacientes com antecedentes de discrasia sangüínea e distúrbios neurológicos. **Interações Medicamentosas:** *Associações desaconselháveis* Dissulfiram: risco de surto delirante, estado confusional e medicamentos contendo álcool. *Associações que necessitam precaução:* Anticoagulantes orais (varfarina): aumento do efeito anticoagulante e do risco hemorrágico por diminuição do metabolismo hepático. Interferências em exames laboratoriais: elevação de ureia nitrogenada e discrasias sanguíneas. **Posologia:** Adultos. Tricomoníase - dose única de 2 comprimidos (mesma dose para o cônjuge); Amebíase intestinal e giardíase - dose única de 2 comprimidos; amebíase hepática – 1,5-2,0g/dia por 5-7 dias. **Obs:** deve ser administrado em uma das refeições, preferencialmente à noite. **Reações Adversas:** reações de hipersensibilidade, náuseas, gastralgia, alteração do paladar (gosto metálico), glossites, estomatites, erupções urticariformes, leucopenia moderada, reversível com a suspensão do tratamento.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

SAC- 0800-4009192

Versão Outubro 2015 - Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 25.06.2014.