

cloridrato de memantina

Medicamento Genérico, Lei nº 9.787, de 1999.

Reg. M.S.: 1.0047.0579

Apresentações: cloridrato de memantina 10mg. Embalagem contendo 30 ou 60 comprimidos revestidos.

Indicações: O cloridrato de memantina é indicado para o tratamento da doença de Alzheimer moderada a grave. **Contraindicações:** É contraindicado para pacientes com hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. A memantina não deve ser utilizada durante a gravidez a menos que seja absolutamente necessária. O cloridrato de memantina não é recomendado para crianças, adolescentes menores de 18 anos e pacientes com comprometimento hepático. **Advertências e precauções:** Pacientes com epilepsia, com antecedentes de episódios convulsivos ou com fatores predisponentes para epilepsia devem ter precaução no uso de cloridrato de memantina. Alguns fatores como alteração na dieta de carnívora para vegetariana, ou a tomada em grande quantidade de produtos gástricos tipo tampão com afeitos alcalinizantes, podem alterar o pH da urina. O cloridrato de memantina contém lactose. Durante o tratamento, o paciente, precisa ter especial atenção ao dirigir carros ou operar máquinas, pois a sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas. **Interações medicamentosas:** A utilização concomitante de memantina com antagonistas do receptor N-mentil-D-aspartato (NMDA), tais como a amantadina, quetamina e o dextrometorfano deverá ser evitada, devido ao risco de psicose farmacotóxica. O uso com cimetidina, ranitidina, procainamida, quinidina, quinina, nicotina e hidroclotiazida também poderão interagir com a memantina levando a um risco potencial de aumento dos níveis séricos. A combinação de cloridrato de memantina e álcool não é recomendada. **Posologia: A dose máxima diária é de 20 mg/dia.** Titulação da dose: A dose inicial recomendada é de 5 mg/dia, que deverá ser aumentada em 5 mg por semana nas 3 semanas subseqüentes. Dose de manutenção: a dose de manutenção recomendada é de 20 mg/dia. A dose recomendada para pacientes de idade superior a 65 anos é de 20 mg/dia. Para pacientes com comprometimento renal moderado a grave a dose diária deverá ser 10mg/dia. **Reações adversas:** Comuns: hipersensibilidade ao medicamento, sonolência, tontura, distúrbio de equilíbrio, hipertensão, dispneia, teste de função hepática elevados, constipação e cefaleia. Frequência desconhecida: reações psicóticas, hepatite e pancreatite.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA**

SAC 0800 400 9192

Versão Setembro/2016 - Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 27/04/2015.