

**CÓD. MATERIAL**

ME171906

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

NOTA EXPLIC DISFOR CAPS

ARQUIVO

00

DATA CONFEÇÃO

18/07/2018

CONFECCIONADO POR

MAGNO

SENTIDO DE BOBINAMENTO

NA

FACE / POSIÇÃO DE IMPRESSÃO

NA

DIMENSIONAL

240 x 150 mm

TIPO DE FACA:

() VERTOPAC
() MEDISEAL
() IMA
() MANUAL
(X) NA

CORES (5x5)

 PANTONE 646 C
 PANTONE 143 C
 PANTONE 640 C
 PANTONE 375 C
 PROCESS BLACK C
 FACA



40 mg

COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II

CÁPSULAS GELATINOSAS MOLES
COLORIDO ARTIFICIALMENTE

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 0,25g (1 cápsula)		
Quantidade por porção		%VD(*)
Valor Energético	0 kcal = 0 kJ	0%
Carboidratos, dos quais:	0 g	0%
Açúcares	0 g	0%
Proteínas	0 g	0%
Gorduras Totais, das quais:	0 g	0%
Gorduras Saturadas	0 g	0%
Gorduras <i>trans</i>	0 g	**
Fibra Alimentar	0 g	0%
Sódio	0 mg	0%

*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

** Valores diários não estabelecidos.

FORNECE 40 mg DE COLÁGENO NÃO HIDROLISADO POR PORÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA.

Ingredientes: óleo de soja, colágeno não hidrolisado tipo II, emulsificante lecitina de soja e cápsula (água purificada, gelificante gelatina, umectante glicerol, glaceante cera de abelha, corantes dióxido de titânio e óxido de ferro amarelo).

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PODE CONTER DERIVADOS DE PEIXE E AMENDOIM.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

ZERO AÇÚCAR.

O que é DISFOR® CAPS?

DISFOR® CAPS é um suplemento nutricional a base de colágeno tipo II não hidrolisado. O colágeno tipo II auxilia na manutenção da cartilagem articular.

A cartilagem articular é composta por células denominadas condrócitos e pela matriz extracelular, composta principalmente por colágeno tipo II e proteoglicanos. Essas moléculas conferem à cartilagem propriedades como rigidez e elasticidade. O equilíbrio entre a produção e a renovação desses componentes garante a manutenção das funções da cartilagem¹.

biolab

Durante a vida e em algumas doenças, como a osteoartrite, o colágeno tipo II e outras estruturas articulares sofrem degeneração, resultando em perda funcional da cartilagem¹.

A suplementação de colágeno auxilia no tratamento de algumas desordens articulares, como a osteoartrite e artrite reumatoide, que envolvem inflamação e degradação da cartilagem articular¹⁻⁴. O uso continuado de colágeno tipo II não hidrolisado leva a redução da dor e melhora da mobilidade articular em indivíduos com doenças articulares, bem como em indivíduos saudáveis, com dor relacionada à prática de atividade física.

Como devo usar DISFOR® CAPS?

Ingerir 1 cápsula ao dia ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.

Como DISFOR® CAPS deve ser guardado?

Guardar em local fresco e seco (15° a 30°).

O Ministério da Saúde adverte: Não existem evidências científicas comprovadas de que este alimento previna, trate ou cure doenças.

Referências bibliográficas:

1 - Rezende UM. Cartilagem Articular e Osteoartrose. Acta Ortop Bras 8(2) - abr/jun, 2000.

2 - Crowley DC, et al. Safety and efficacy of undenatured type II collagen in the treatment of osteoarthritis of the knee: a clinical trial. Nt J Med Sci 2009; 6(6):312-321.

3 - Lugo J, et.al. Undenatured type II collagen (UC-II®) for joint support: a randomized, double-blind, placebo-controlled study in healthy volunteers. J Int Soc Sports Nutr. 2013; 10: 48.

4 - Bioiberica. B-2COOL® Low dose, great effects.

Disponível em: https://www.bioiberica.com/files/pagina/pdf/20180308125339_1.pdf

Acesso em: 12/06/2018.

Reg. M.S.: 6.7198.0070

Resp. Técnico: Morena E. G. Cunha - CRF/SP 43.652

biolab

Fabricado por:

Catalent Brasil Ltda.
Av. José Vieira, 446 Distrito Industrial
Indaiatuba - SP - CEP 13347-360
CNPJ 45.569.555/0007-82
Indústria Brasileira

Distribuído por:

Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.
Rodovia Fernão Dias, S/N Km 933, Norte
Extrema - MG - CEP 37640-000
CNPJ 49.475.833/0016-84
SAC 0800 724 6522

MEI1906 - PHC 3392 - DIM: 240 X 150 mm