day on mars - 18-056 -BRESIL - COCYNTAL

Modifié le17/01/2019 à 08:59

PRODUCTION - Relecture No: 3

Code prodstar: PRO.1EMX - Code laetus: 596

Format: 150 x 330 mm

Tracé: PN 029_Boiron_Notice MTV 330x150 pliee - C - 0917.pdf Corps texte: 10 pt (x= 1,6 mm), interlignage 11 pt, étroitisé à 100 %

Taille «®» logo BOIRON: 1,4 mm Taille logo BOIRON: 20 mm <u>Taille «®» nom produit :</u> 1,4 mm

Couleurs: Noir

■ Tracé simplifié (Découpe) ■ Infos cartouche

APPROUVÉ

Par girieud, 10:13, 25/01/2019





Carbo vegetabilis 5 CH + Colocynthis 9 CH+ Cuprum metallicum 5 CH MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

APRESENTAÇÕES

COCYNTAL[®] Solução oral com 10 e 30 flaconetes dose única de 1,0 ml.

VIA ORAL

USO PEDIÁTRICO – BEBÊS ACIMA DE 1 MÊS

COMPOSIÇÃO

Cada flaconete dose única de 1,0 ml contém: *Carbo vegetabilis* 5 CH333,3 mg Cuprum metallicum 5 CH......333,3 mg Colocynthis 9 CH 333,3 mg Excipiente qsp1,0 ml (1 flaconete)

Excipientes: Água purificada. Não contém açúcar.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

COCYNTAL® é indicado como Auxiliar no alívio do desconforto causado pelas cólicas.

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

COCYNTAL® está de acordo com o princípio da Homeopatia, que afirma que as substâncias capazes de desenvolver sintomas em indivíduos sadios através da experimentação, são utilizadas em doses homeopáticas para curar esses mesmos distúrbios.

A ação esperada do medicamento é o alívio do desconforto causado pelas cólicas dos bebês e recém-nascidos, contra dores abdominais, gases intestinais e agitação.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve utilizar COCYNTAL® se tiver hipersensibilidade (alergia) aos componentes da fórmula.

4. O QUE EU DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

COCYNTAL® deve ser utilizado por via oral. ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER INJETADO. NÃO INSTILAR NOS OLHOS OU OUVIDOS.

Até o momento, não são conhecidas informações sobre relatos de interações de **COCYNTAL**[®] com outros medicamentos ou alimentos.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE **MEDICAMENTO?**

Você deve conservar COCYNTAL® em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz e da umidade. Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de fabricação. Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

A solução oral de COCYNTAL® deve estar límpida, transparente e sem partículas

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.


6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Utilize um flaconete dose única em caso de cólicas, até 8 doses ao dia com intervalo entre as doses de uma hora. Espaçar as doses conforme melhora e cessar as doses com o desaparecimento dos sintomas.

Um episódio de cólica necessita, geralmente, de um tratamento por alguns dias. As cólicas podem aparecer de forma repetitiva durante os primeiros meses de vida do bebê, dessa forma será necessário prolongar o tratamento.

Contatar seu médico se seu bebê permanecer inconsolável por mais de 2 horas.

Lave as mãos antes de utilizar as doses únicas e siga as orientações abaixo para administração:



1- Abrir o sachê de alumínio



2- Destacar um flaconete dose única da cartela



3- Abrir o flaconete dose única girando a parte superior



- **4-** Colocar a criança em posição sentada. Verter o conteúdo do flaconete dose única, apertando-o ligeiramente, na boca da criança.
- 5- Fechar cuidadosamente o sachê contendo os outros flaconetes dose única dobrando o lado aberto.

O conteúdo do flaconete é uma solução oral estéril, portanto, não deve ser guardada. Descarte-o logo após a sua utilização.

Você deve utilizar um novo flaconete a cada administração.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em 2 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

 $\mathbf{COCYNTAL}^{\textcircled{n}}$ pode ser administrado assim que se lembrar. Não exceda a dose recomendada para cada dia.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Até o momento, não são conhecidas informações sobre relatos de reações adversas durante a utilização de COCYNTAL®.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento.

Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Até o momento, não são conhecidas informações sobre relatos de casos de superdosagem durante a utilização do medicamento **COCYNTAL®**.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Medicamento dinamizado notificado junto à ANVISA conforme RDC no. 238/2018. Farm.Resp.: Dra. Thaíse de Siqueira Dal Mas Dias - CRF-SP No 90.975

Importado e Distribuído por:

BOIRON MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS LTDA

Rua Joaquim Floriano, 1120 conj. 41 - CEP 04534-000 - São Paulo - S.P. CNPJ 07.498.711/0001-87

Fabricado por:

BOIRON S.A., ZAC de Frênes, 1, rue Edouard Buffard 77144 – Montévrain – FRANÇA www.boiron.com.br

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA. SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Sac Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 724 5858

