

INFORMAÇÕES RESUMIDAS DO PRODUTO:

Succinato de desvenlafaxina monoidratado comprimidos de 50mg e 100mg.

INDICAÇÕES: tratamento do transtorno depressivo maior.

CONTRAINDICAÇÕES: Em pacientes com hipersensibilidade ao succinato de desvenlafaxina monoidratado, ao cloridrato de venlafaxina ou a qualquer componente da fórmula. Não deve ser utilizado simultaneamente com inibidores da monoaminoxidase e outros medicamentos que contenham venlafaxina e/ou desvenlafaxina. **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:** Durante o tratamento, o

paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois a sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas. Este medicamento pode causar doping.

GRAVIDEZ: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. **LACTAÇÃO:** Não é recomendado usar este

medicamento durante a amamentação. **INTERAÇÕES**

MEDICAMENTOSAS: **Álcool:** Não é recomendado o uso de succinato de desvenlafaxina monoidratado concomitante ao álcool. Inibidores de monoaminoxidase, agentes ativos do sistema nervoso central, uso concomitante de outros agentes que podem afetar o sistema neurotransmissor serotoninérgico, com medicamentos que prejudicam o metabolismo da serotonina ou com precursores da serotonina, medicamentos que interferem na hemostase (ex. anti-inflamatórios não esteroidais, ácido acetilsalicílico e varfarina). **REAÇÕES ADVERSAS:**

Insônia, dor de cabeça, sonolência, tontura, náusea, boca seca e hiperidrose.

POSOLOGIA: A dose recomendada deste medicamento é de 50 mg por dia, com ou sem alimentos. O médico pode indicar aumento gradativo da dosagem, o que deve acontecer em intervalos de 7 dias. A dose máxima não pode ser maior do que 200 mg/dia. **USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DE RECEITA.** Registro MS nº. 1.8326.0275IB081118.

"Para maiores informações antes de prescrever, favor ler a bula completa do produto." "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO."