

Forteviron®

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: FORTEVIRON®

Insumos ativos: Agnus castus, Conium maculatum, Nuphar luteum, Onosmodium virginianum

Medicamento Homeopático

APRESENTAÇÕES

Caixa contendo 01 *blister* com 20 comprimidos de 250 mg

Caixa contendo 12 *blisters* com 20 comprimidos de 250 mg

Caixa contendo 15 *blisters* com 4 comprimidos de 250 mg

Caixa contendo 30 *blisters* com 4 comprimidos de 250 mg

Forma farmacêutica: Comprimido simples

Concentração por unidade de medida:

Agnus castus.....	6CH.....	6,25 µL
Conium maculatum.....	6CH.....	6,25 µL
Nuphar luteum.....	6CH.....	6,25 µL
Onosmodium virginianum	6CH.....	6,25 µL
Excipiente q.s.p.....		250 mg

Via de administração: **ORAL**

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de 250 mg contém:

Agnus castus.....	6CH	6,25 µL
Conium maculatum.....	6CH	6,25 µL
Nuphar luteum.....	6CH	6,25 µL
Onosmodium virginianum.....	6CH.....	6,25 µL
Excipiente q.s.p.....		250 mg
(Lactose monoidratada, Amido, Estearato de magnésio e Dióxido de silício)		

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

FORTEVIRON® é um medicamento de ação progressiva que auxilia e estimula o organismo a combater a fraqueza física e mental, ativando o desempenho sexual de homens e mulheres. Também é indicado como auxiliar para homens e mulheres com intensa atividade física e intelectual.

Para homens: como auxiliar no tratamento da fraqueza física e mental, depressão mental, irritabilidade, cefaleia, prostração geral, memória fraca (perda de memória), diminuição ou ausência de desejo sexual, ejaculação precoce, espermatorreia e impotência sexual.

Para mulheres: como auxiliar no tratamento da fraqueza física e mental, depressão mental, irritabilidade, cefaleia, prostração geral,

memória fraca (perda de memória), diminuição ou ausência de desejo sexual e frigidez.

Agnus castus - Atua como auxiliar na neurastenia sexual, melancolia, tristeza, depressão mental, perda da memória, ausência ou diminuição de desejos sexuais, impotência sexual e na frigidez.

Conium maculatum - Atua como auxiliar na melancolia, tristeza, memória fraca (perda de memória), irritabilidade, fraqueza física e mental, impotência, ejaculação precoce, ereções curtas e insuficientes e debilidade sexual.

Nuphar luteum - Atua como auxiliar na fraqueza, ausência ou diminuição de desejo sexual, impotência sexual e na espermatorreia.

Onosmodium virginianum - Atua como auxiliar na fraqueza, cefaleia, insônia, prostração geral, diminuição ou perda do desejo sexual em ambos os sexos, fraqueza sexual e na ejaculação rápida.

FORTEVIRON® é auxiliar como revigorante e ativador sexual.

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

FORTEVIRON® é um medicamento homeopático composto de substâncias referenciadas na matéria médica homeopática, que auxilia e estimula o organismo a combater a fraqueza física e mental, ativando o desempenho sexual de homens e mulheres. Também é indicado como auxiliar para homens e mulheres com intensa atividade física e intelectual.

O mecanismo de ação deste medicamento baseia-se no princípio da “cura do semelhante pelo semelhante”, descrito na Matéria Médica (GUERMONPREZ, M.; PINKAS, M. e TORCK, M. – *Matiere Medicale Homeopathique*, 3.^a ed., França; Édition Boiron, 1989).

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contra-indicado para menores de 12 (doze) anos.

Até o momento, são desconhecidas informações sobre as contra-indicações do medicamento FORTEVIRON®.

Pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula devem fazer uso do medicamento FORTEVIRON® sob orientação médica.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista (categoria “C”).

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Um intervalo de 15 minutos deve ser respeitado entre a administração de FORTEVIRON® e as refeições.

Pela manhã deve-se aguardar, pelo menos, 15 minutos da ingestão de FORTEVIRON®, para o café da manhã.

À noite, deve-se aguardar, no mínimo, 15 minutos após a última refeição para se fazer uso de FORTEVIRON®.

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao médico se está amamentando.

Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

Até o momento, são desconhecidas informações sobre reações adversas do medicamento FORTEVIRON®.

Este medicamento contém LACTOSE.

Até o momento, são desconhecidas interações no uso do medicamento FORTEVIRON® associado a alimentos ou bebidas alcoólicas.

Até o momento, são desconhecidas alterações em exames laboratoriais no uso do medicamento FORTEVIRON®.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

“Distúrbios relacionados a disfunções sexuais e fraqueza física e mental podem necessitar de atenção médica. Este medicamento não substitui o acompanhamento médico periódico.”

“Este medicamento não substitui nenhuma orientação ou medicação prescrita pelo seu médico.”

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em local seco e à temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C). Proteger da umidade. Evitar radiações.

Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Número de lote e data de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento: comprimidos brancos e sem odor (inodoros).

Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Administração Via Oral

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias pode envolver risco e deve estar sob a responsabilidade do prescritor.

Posologia Sugerida:

Adultos

Tomar 2 (dois) comprimidos pela manhã, em jejum, e 2 (dois) comprimidos à noite, ao deitar, durante os primeiros 90 (noventa) dias, ou a critério médico.

Após este período, tomar 1 (um) comprimido pela manhã, em jejum, e 1 (um) comprimido à noite, ao deitar, ou a critério médico.

Mantenha sempre a dose e a frequência indicadas pelo prescritor ou o modo de tomar sugerido nesta bula, até remissão total dos sintomas.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Até o momento são desconhecidas informações sobre as reações adversas do medicamento FORTEVIRON®.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de ingestão acidental e/ou acima da dose sugerida/prescrita pelo clínico ou em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure o clínico ou o farmacêutico.

Na eventualidade de superdosagem acidental, poderá ser aplicada terapia sintomática (sintomas apresentados), com auxílio médico, levando em consideração de que não há evidências descritas de intoxicações agudas com medicamentos homeopáticos.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Registro no Ministério da Saúde: M.S. n.º 1.0247.0024

Farmacêutica Responsável: Dr.ª Giselle da Costa Mateus CRF - PR 16959

Empresa Titular do Registro:

Homeopatia Waldemiro Pereira - Laboratório Industrial Farmacêutico Ltda.

Rua Anne Frank, 3246-B - Curitiba - PR - CEP 81650-020

CNPJ: 76.440.528/0001-43

Indústria Brasileira

SAC: Fone: (41) 3013-6464 - sac@wplab.ind.br

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 30/07/18.



Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.

