

FLOMICIN®  
Saccharomyces boulardii

neo  
química

APRESENTAÇÃO

Cápsula dura.  
Embalagem contendo 6 cápsulas duras.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: ORAL  
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula dura contém:  
Saccharomyces boulardii liofilizado ..... 200mg  
(200mg de liofilizado contém no mínimo 1 x 10<sup>9</sup>  
células de Saccharomyces boulardii)  
excipientes q.s.p. .... 1 cápsula dura  
(dióxido de silício, lactose, sacarose, dióxido  
de titânio, azul brilhante, vermelho allura 129 e  
gelatina).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É  
INDICADO?

Flomicin® está indicado como adjuvante no  
tratamento da diarreia de diferentes causas  
(como por exemplo, produzida por Clostridium  
difficile, por antibioticoterapia ou quimioterapia), e  
na restauração da flora intestinal.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO  
FUNCIONA?

A substância ativa deste medicamento é o  
Saccharomyces boulardii, um probiótico, ou seja,  
um microrganismo vivo que, quando administrado  
em quantidade adequada traz benefício para a  
sua saúde. Como função benéfica ao organismo,  
o Saccharomyces boulardii tem efeito sobre o  
equilíbrio bacteriano intestinal e sobre o controle de  
diarreias.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE  
MEDICAMENTO?

Flomicin® é contraindicado para pacientes com  
hipersensibilidade ao Saccharomyces boulardii ou  
aos demais componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR  
ESTE MEDICAMENTO?

O manuseio das cápsulas de Flomicin® requer  
cuidados caso você esteja fazendo uso de cateter  
venoso central. Este medicamento não é absorvido,  
portanto, não são conhecidas restrições ao uso de  
Flomicin®, que pode ser empregado também em

gestantes, mulheres que estejam amamentando e  
lactentes.

Gravidez e amamentação

Este medicamento pode ser utilizado durante a  
gravidez desde que sob prescrição médica ou do  
cirurgião-dentista.

Interações com alimentos, bebidas e outros  
medicamentos

Não são conhecidas interações medicamentosas para  
este medicamento, a não ser diminuição da sua ação  
quando é tomado juntamente com medicamentos  
para tratar micoses (fungicidas ou fungistáticos), pois  
podem reduzir ou anular o efeito terapêutico deste  
medicamento.

Se você se encontra sob tratamento com antibióticos  
ou quimioterápicos, ingerir Flomicin® um pouco  
antes desses medicamentos.

Não utilizar o produto junto com bebidas alcoólicas.

Efeitos sobre a capacidade de dirigir e operar  
máquinas: os efeitos do Flomicin® sobre a  
capacidade de dirigir e operar máquinas são nulos  
ou desprezíveis. Você pode dirigir e operar máquinas  
normalmente durante seu tratamento.

Alterações em exames clínicos e laboratoriais:  
até o momento não foram relatadas alterações em  
exames clínicos e laboratoriais. Porém, recomenda-  
se informar ao laboratório clínico o uso deste  
medicamento.

Atenção: Contém lactose e sacarose.

Este medicamento não deve ser usado por  
pessoas com síndrome de má-absorção de  
glicose-galactose.

Este medicamento não deve ser usado por  
pessoas com insuficiência de sacarose-  
isomaltase.

Atenção: Deve ser usado com cautela por  
portadores de Diabetes.

Atenção: Contém os corantes dióxido de  
titânio, azul brilhante e vermelho allura 129  
que podem eventualmente causar reações  
alérgicas.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista  
se você está fazendo uso de algum outro  
medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO  
TEMPO POSSO GUARDAR ESTE  
MEDICAMENTO?

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a  
30°C). Proteger da umidade.

Número de lote e datas de fabricação e  
validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade  
vencido. Guarde-o em sua embalagem original.  
Flomicin® cápsula dura apresenta-se como

456

220 mm

456

pantone

000

000

000

000

000

000

cmyk

motivo

\* Lançamento de nova apresentação.

\* PR2772/22.

data

24/09/2024

circulação

03

cod. proposto

483879

cod. anterior

000000

número de CM

000000

tipo de bula

AB ☒ DB ☐ PDBo

cápsula gelatinosa dura na cor tampa azul e corpo branco, contendo mistura não homogênea de cor bege a marrom com pontos brancos isentos de partículas.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

**6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

As cápsulas devem ser engolidas inteiras, sem mastigar, com um pouco de líquido. Para crianças pequenas ou pessoas com dificuldades de engolir, as cápsulas podem ser abertas, adicionando-se o conteúdo a mamadeiras e a pequenas quantidades de líquidos ou alimentos semissólidos. Não adicionar o produto a líquidos ou alimentos quentes (temperatura acima de 60°C) ou gelados, assim como a bebidas alcoólicas. Uma vez abertas as cápsulas, seu conteúdo deve ser imediatamente ingerido, pois o contato com o ar e a umidade altera o prazo de validade do produto. Deve ser tomado de preferência em jejum ou 30 (trinta) minutos antes das refeições.

**Posologia:**

- Nas alterações agudas da flora intestinal e na diarreia por *Clostridium difficile*: uma cápsula, duas vezes ao dia.
- Nas alterações crônicas da flora intestinal: uma cápsula, uma vez ao dia.

A posologia deste medicamento pode ser alterada a critério médico. Na maioria dos casos, são suficientes três dias de tratamento. Se os sintomas persistirem após cinco dias, procure o médico.

No caso de pacientes sob tratamento com antibióticos e quimioterápicos, administrar Flomicin® cápsula dura um pouco antes desses agentes.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

**7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se você se esquecer de tomar uma dose na hora certa, tome-a assim que possível e depois reajuste os horários de acordo com esta última tomada, continuando o tratamento de acordo com os novos horários programados. Não dobre a dose para

compensar a dose esquecida.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

**8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Sede e obstipação foram os eventos adversos mais significativos em um estudo clínico. Em algumas crianças ou lactentes, pôde-se observar o odor de fermento nas fezes, sem qualquer significado nocivo.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não são conhecidos sintomas provocados por uma dose excessiva de Flomicin®.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

Registro: 1.5584.0458

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.**

 SAC 0800 97 99 900

neo  
química



**Registrado e produzido por:**  
**Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A.**  
VPR 3 - Quadra 2- C - Módulo 01- B  
DAIA - Anápolis - GO - CEP 75132-015  
C.N.P.J.: 05.161.069/0001-10  
Indústria Brasileira

**Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 16/09/2024.**

456 - F10 - 483879 - 09/2024

pantone

000

000

000

000

000

000

cmyk

motivo

\* Lançamento de nova apresentação.

\* PR2772/22.

data

24/09/2024

circulação

03

cod. proposto

483879

cod. anterior

000000

número de CM

000000

tipo de bula

AB ☒ DB ☐ PDBo